

# CICATUL® n.f.

EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE

2-FENOXIETANOL

## Crema vaginal

Industria Argentina

Venta bajo receta

### COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de crema vaginal contiene:  
Extracto acuoso de Triticum vulgare 20 g; 2-Fenoxietanol 1 g.  
Excipientes: Propilenglicol; Metilparabeno; Propilparabeno; Vaselina líquida;  
Standamul 1000 NI; Cera lanette; Cetiol HE; Agua deionizada, c.s.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Cicatrizante, antiséptico, reepitelizante, regenerador tisular.

### INDICACIONES:

Indicada para activar procesos de cicatrización y reepitelización de lesiones cervicovaginales. Trastornos inflamatorios y distróficos de la mucosa vaginal. Erosiones cervicales y cervicitis. Vulvitis y vulvovaginitis crónicas. Tratamiento regenerativo cérvico-vaginal. Lesiones consecutivas a radioterapia y toda afección del aparato genital femenino, que requiera una acción cicatrizante, antiséptica y/o anti-inflamatoria.

### PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

El extracto acuoso de Triticum Vulgare ejerce una intensa aceleración de los procesos reparativos tisulares, estimula la quimiostasis y la maduración fibroblástica y aumenta significativamente el índice fibroblástico, punto crucial del proceso reparativo. Tal actividad se encuentra confirmada tanto por el aumento de la síntesis proteica como por el aumento de la capacidad de captación e incorporación de la prolina marcada, por parte de los tejidos. El 2-Fenoxietanol ejerce acción bacteriostática sobre microorganismos grampositivos y gramnegativos incluyendo a Pseudomona aeruginosa, por lo cual, reduce la aparición de infecciones y actúa como coadyuvante de la terapéutica antimicrobiana.

### POSOLOGÍA y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

1 ó 2 aplicaciones diarias o según criterio médico. Para aplicar proceder del siguiente modo:

- Perforar el pomo utilizando el pico perforador de la tapa.
- Colocar en el pomo un aplicador vaginal.
- Presionar el pomo de crema hasta llenar totalmente el aplicador.
- Sacar el aplicador del pomo, introducir profundamente en la vagina y presionar el émbolo hasta vaciar el aplicador.

*Cada aplicador debe utilizarse una sola vez y luego descartarse.*

### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de sus componentes.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Como todos los productos de uso tópico, el uso prolongado, puede ocasionar la aparición de sensibilización. En este caso, se debe suspender el tratamiento.

### EFFECTOS ADVERSOS:

No se han reportado efectos adversos.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Cicatul®n.f. puede ser administrado durante el embarazo y la lactancia ya que no tiene ninguna influencia sobre el proceso de gestación y el desarrollo embriofetal y neonatal.

### INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS:

No se conocen interacciones o incompatibilidades a la fecha.

### SOBREDOSIFICACIÓN:

No se han reportado casos de sobredosis.  
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:  
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247  
- Hospital de Agudos Dr. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4654-6648/4658-7777

### PRESENTACIONES:

Envase x 60 g con aplicadores.

### MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO, A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR DE 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 40.986

Fecha de última revisión: Junio 2009.



Laboratorios RAYMOS S.A.  
Cuba 2760 - Buenos Aires  
Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico

**CICATUL® n.f.**

## EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE 2-FENOXIETANOL

### Gasas

Venta bajo receta

#### COMPOSICIÓN:

Cada gasa embebida con 4 gramos de crema contiene:  
Extracto acuoso de Triticum vulgare 0,6 g; 2-Fenoxietanol 0,04 g.  
Excipientes: Polietilenglicol 400; Polietilenglicol 1500; Polietilenglicol 4000;  
Vaselina líquida; Alcohol cetílico; Alcohol estearílico; Glicerina; Sorbitol;  
Esencia de lavanda; Esencia de coriandro, c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Cicatrizante, antiséptico, reepitelizante, regenerador tisular.

#### INDICACIONES:

Indicadas en el tratamiento tópico de todas las alteraciones del tejido dérmico que necesitan la reactivación de los procesos de neoformación epitelial. Quemaduras de cualquier grado y extensión. Retardo de cicatrización de heridas. Alteraciones úlcero-distróficas: úlceras varicosas, úlceras tórpidas o por decúbito, fistulas. Heridas post quirúrgicas, episiotomías, cicatriz de cesárea, cirugía plástica y estética. Heridas lásero-contusas. Dermatitis, costra láctea, dermatitis del pañal.

#### PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

El extracto acuoso de Triticum Vulgare ejerce una intensa aceleración de los procesos reparativos tisulares, estimula la quimiostasis y la maduración fibroblástica y aumenta significativamente el índice fibroblástico, punto crucial del proceso reparativo. Tal actividad se encuentra confirmada tanto por el aumento de la síntesis proteica como por el aumento de la capacidad de captación e incorporación de la prolina marcada, por parte de los tejidos. El 2-Fenoxietanol ejerce acción bacteriostática sobre microorganismos grampositivos y gramnegativos incluyendo a Pseudomona aeruginosa, por lo cual, reduce la aparición de infecciones y actúa como coadyuvante de la terapéutica antimicrobiana.

#### POSOLOGÍA y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

De 1 a 2 aplicaciones por día. Las gasas deben aplicarse previa limpieza y desinfección de la zona lesionada, cubriéndola luego con un apósito estéril.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de sus componentes.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Como todos los productos de uso tópico, el uso prolongado, puede ocasionar la aparición de sensibilización. En este caso, se debe suspender el tratamiento.

#### EFFECTOS ADVERSOS:

No se han reportado efectos adversos.

#### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Cicatul® n.f. puede ser administrado durante el embarazo y la lactancia ya que no tiene ninguna influencia sobre el proceso de gestación y el desarrollo embriofetal y neonatal.

#### INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS:

No se conocen interacciones o incompatibilidades a la fecha.

#### SOBREDOSIFICACIÓN:

No se han reportado casos de sobredosis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:  
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247  
- Hospital de Agudos Dr. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4654-6648/4658-7777

#### PRESENTACIONES:

Envase x 10 gasas.

#### MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO, A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR DE 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado Nº 40.986.

Elaborado en: E. Scaglione, 27. 80145 - Napoli - Italia.  
Empacado en: Cuba 2760 - Buenos Aires.

Fecha de última revisión: Junio 2009.



Laboratorios **RAYMOS SACI**  
Cuba 2760 - Buenos Aires  
Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico

# CICATUL® n.f.

## EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE

### 2-FENOXIETANOL

#### Crema dérmica - Óvulos

Industria Argentina

Venta bajo receta

#### COMPOSICIÓN:

##### CREMA DÉRMICA:

Cada 100 g de crema dérmica contiene:

Extracto acuoso de Triticum vulgare 15 g; 2-Fenoxietanol 1 g.

Excipientes: Polietilenglicol 400; Polietilenglicol 1500; Polietilenglicol 4000;

Vaselina líquida; Alcohol cetílico; Alcohol estearílico; Glicerina; Sorbitol;

Esencia de lavanda; Esencia de coriandro, c.s.

##### ÓVULOS:

Cada óvulo contiene:

Extracto acuoso de Triticum vulgare 600 mg; 2-Fenoxietanol 40 mg.

Excipientes: Glicéridos de ácidos grasos saturados, c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Cicatrizante, antiséptico, reepitelizante, regenerador tisular.

#### INDICACIONES:

Crema dérmica: Indicado en el tratamiento tópico de todas las alteraciones del tejido dérmico que necesitan la reactivación de los procesos de neoformación epitelial. Quemaduras de cualquier grado y extensión. Retardo de cicatrización de heridas. Alteraciones úlcero-distróficas: úlceras varicosas, úlceras tórpidas o por decúbito, fístulas. Heridas post quirúrgicas, episiotomías, cicatriz de cesárea, cirugía plástica y estética. Heridas lálcero-contusas. Dermatitis, costra lálctea, dermatitis del pañal.

Óvulos: Indicado para activar procesos de cicatrización y reepitelización de lesiones cervicovaginales. Trastornos inflamatorios y distróficos de la mucosa vaginal. Erosiones cervicales y cervicitis. Vulvitis y vulvovaginitis crónicas. Tratamiento regenerativo cérvico- vaginal.

Lesiones consecutivas a radioterapia y toda afección del aparato genital femenino, que requiera una acción cicatrizante, antiséptica y/o antiinflamatoria.

#### PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

El extracto acuoso de Triticum Vulgare ejerce una intensa aceleración de los procesos reparativos tisulares, estimula la quimiosíntesis y la maduración fibroblástica y aumenta significativamente el índice fibroblástico, punto crucial del proceso reparativo. Tal actividad se encuentra confirmada tanto por el aumento de la síntesis proteica como por el aumento de la capacidad de captación e incorporación de la prolina marcada, por parte de los tejidos.

El 2-Fenoxietanol ejerce acción bacteriostática sobre microorganismos grampositivos y gramnegativos incluyendo a Pseudomonas aeruginosa, por lo cual, reduce la aparición de infecciones y actúa como coadyuvante de la terapéutica antimicrobiana.

#### POSOLOGÍA y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

*Crema dérmica:* Aplicar la cantidad de crema suficiente para cubrir el área afectada, 2 veces al día. En el caso en que la lesión lo requiera, recubrir con gasa estéril, eventualmente embebida con la crema para mantener la humedad. La duración del tratamiento se determinará de acuerdo a la respuesta de la lesión.

*Óvulos:* Administrar un óvulo al día, preferentemente por la noche antes de acostarse, o según prescripción médica, introduciéndolo en el fondo de la vagina.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de sus componentes.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Como todos los productos de uso tópico, el uso prolongado, puede ocasionar la aparición de sensibilización. En este caso, se debe suspender el tratamiento.

#### EFFECTOS ADVERSOS:

No se han reportado efectos adversos.

#### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Cicatul® n.f. puede ser administrado durante el embarazo y la lactancia ya que no tiene ninguna influencia teratogénica sobre el proceso de gestación y el desarrollo embriofetal y neonatal.

#### INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS:

No se conocen interacciones o incompatibilidades a la fecha.

#### SOBREDOSIFICACIÓN:

No se han reportado casos de sobredosis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247

- Hospital de Agudos Dr. Alejandro Posadas: Tel: (011) 4654-6648/4658-7777

#### PRESENTACIONES:

Crema dérmica: Envases x 30 g

Óvulos: Envase x 6 óvulos

#### MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO, A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR DE 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 40.986

Fecha de última revisión: Junio 2009.



Laboratorios RAYMOS SACI

Cuba 2760 - Buenos Aires

Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico